

ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### 特徴

- 痛みの原因物質の生成を抑えるジクロフェナクナトリウムを配合したローション剤です。
- メントール配合で清涼感のある無色透明なローションです。
- 広い範囲に塗布しやすいデカヘッド容器を採用しました。また、首の部分が曲がっているため、背中や腰などの塗りにくい患部にもスムーズに塗布できます。

### ⚠️ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)
  - (3) 湿疹、かぶれ、傷口
  - (4) みずむし、たむし等又は化粧している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。

#### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の医薬品の投与を受けている人  
ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水泡、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水泡・たれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があつた部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。


### 【用法・用量】

1日3～4回適量を患部に塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

#### ◀用法及び用量に関連する注意▶

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (3) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (5) 本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 使用する際は、スポンジ面をゆっくり患部に数回押し当て、スポンジに薬液を十分しみ込ませてから塗布してください。(スポンジ面に薬液が十分しみ込んでいない状態で使用すると、スポンジが破損する場合があります。)

※暑い時期など、内圧が高まり、薬液が多く出ることがありますので、ご使用前に、キャップを開けて容器を立てたま、スポンジ部分を数回押ししてください。



製造販売元  
ジャパンメディック株式会社  
富山県富山市横越168

お客様相談窓口 ☎076-438-1107  
受付時間：9:00～17:00  
月～金(祝祭日・年末年始を除く)

副作用被害救済制度の間合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

大容量 80ml

第2類医薬品

# 腰痛、肩こりの 痛みに

ジクロフェナクナトリウム  
メントール配合

デカヘッド

25mm

広範囲に塗りやすい!



肩こり・腰痛の  
痛みに  
ジクロフェナクナトリウム  
メントール配合  
dZローション  
80ml (第2類医薬品)

鎮痛消炎薬

dZローション

### 【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

### 【成分・分量】(1g中)

ジクロフェナクナトリウム…10mg  
(痛みの原因物質の生成を抑えます。)  
メントール…30mg  
(清涼感を与え、痛みをやわらげます。)  
添加物:ピロ亜硫酸Na、乳酸、イソプロパノール

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 使用後は、速やかにキャップを十分に閉めて、直射日光の当たらない涼しい所に立てて保管してください。(保管方法を守らないと、塗布部のスポンジ破損の原因になったり、液漏れにつながる恐れがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 時計、めがね等の金属類、プラスチック類、化学繊維類、皮革製品、塗装のしたる床・家具類に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6) 衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗ってください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

### 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ  
イソプロパノール 水溶性



4 956622 106988