

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎薬

デキサトップ クリーム

一般にしっしん、じんましん、かぶれなどには激しいかゆみや炎症がともない、つかき破って症状を悪化させる場合がよくあります。

デキサトップ クリームは有効成分のはたらきにより、かゆみ・炎症をおさえる親水性の伸びのよいクリームです。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

● 成分・分量（100g中）

デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g
グリチルレチン酸	0.3g
クロタミトン	10.0g

添加物としてセタノール、パラフィン、メチルポリシロキサン、ミリスチン酸オクチルドデシル、モノステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール1000、1,3-ブチレングリコール、パラベン、イソプロピルメチルフェノール、pH調節剤（クエン酸水和物、その他）、香料を含有します。

● 用法・用量

1日 2～3回 適量を塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

● 効能・効果

湿疹、皮膚炎、じんましん、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

○ お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部
 電話(0798)42-6940(代表)
 受付時間 月～金曜日 9:30～17:00
 (祝祭日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社
 東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元

六陽製薬株式会社
 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-63