

第3類医薬品

DHC 気孔シート

DHC  
気孔シート

筋肉  
疲労  
に

痛み

こり



ビタミンE 配合

第3類医薬品

20枚

製造番号

使用期限

2016D

2015.9

◆成分・分量◆ 1.0m<sup>2</sup>中

サリチル酸メチル	9.00g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g
dl-カンフル	1.80g
ハッカ油	1.20g
トメントール	4.50g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有します。

◆保管及び取扱い上の注意◆

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. 開封後は袋の口を折り曲げ、外箱に入れて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ビタミン  
E  
配合

こり、痛み、筋肉疲労に

## DHC 気孔シート

第3類医薬品

<外用消炎鎮痛薬>

20枚 (74mm×52mm)

◆ 使用上の注意 ◆

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 1. 次の人は使用しないでください。天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

**用法・用量** 1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

### 用法・用量に関連する注意

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
4. 皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
5. 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼ることを避けてください。
6. 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。

◆ 注意 ◆

使用するときは、この箱の説明文をよく読んでください。

医薬品  
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00～17:00(日・祝日をのぞく)

副作用被害救済制度の問合せ先

0120-149-931

製造販売元  
株式会社ディーエイチシー  
東京都港区南麻布2-7-1 0120-333-906

DHC

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>

携帯 <http://www.dhc.jp>



内袋



外箱

4 511413 800652