

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

外用鎮痒消炎剤

キンカンピラック®

クリーム

■ 特 長 ■

- ◎5つの成分の4つの効果で虫さされによるはれやかゆみにしっかりと効きます。
 - ・かゆみ止め：クロタミトン、リドカイン
 - ・皮膚の修復：アラントイン
 - ・抗炎症：プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
 - ・殺菌：イソプロピルメチルフェノール
- ◎PVA(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)は、患部で優れた抗炎症作用を発揮し、その後、体内に吸収されると作用の穏やかな物質に分解される特性があります。
- ◎よくのびて、べたつかないクリームです。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2) すり傷、切り傷。
- (3) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。

2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果 ■

湿疹、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん、あせも、虫さされ

■ 用法・用量 ■

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 塗布後、その部位をラップフィルムなどの通気性の悪いものでおおわないでください。

■ 成分・分量 ■ 1g中

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5 mg
クロタミトン	50 mg
アラントイン	2 mg
リドカイン	10 mg
イソプロピルメチルフェノール	1 mg

添加物としてポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、グリセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、メチルフェニルポリシロキサン、スクワラン、パラベン、エデト酸Na、pH 調節剤を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■ お客様相談窓口 ■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 電話 03-3421-6171

[電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～16:00]

発売元
株式会社 金冠堂
東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14
<http://www.kinkan.co.jp>

製造販売元
セントラル製薬株式会社
大阪市中央区北浜東1番29号