

鎮痛・消炎パップ剤 第3類医薬品

# ハップスターDX

打撲・ねんざ・肩こり・筋肉痛・腰痛

### 【特長】

- ハップスターDXは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった、さわやかな香りのする冷感パップ剤です。
- ハップスターDXは、炎症や痛み及び血行促進に効果のある有効成分が皮膚から吸収されて、すぐれた効きめを発揮します。
- ハップスターDXは、生薬成分（オウバク軟エキス、サンシシ軟エキス）を配合していますので、さらにすぐれた鎮痛・消炎効果を発揮します。
- ハップスターDXは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

### 【効能・効果】

打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、しもやけ、骨折痛

### 【用法・用量】

表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1～2回貼付する。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮ふの弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)

【成分・分量】本品膏体100g (875cm<sup>2</sup>) 中

サリチル酸グリコール	1.0g
l-メントール	1.0g
dl-カンフル	0.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
オウバク軟エキス (原生薬換算量2.31g)	0.7g
サンシシ軟エキス (原生薬換算量1.0g)	0.33g
添加物として、ゼラチン、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、尿素、エデト酸Na、カオリン、酸化チタン、pH調整剤、その他3成分を含有する。	

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと二重に折り曲げて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】10枚入 [5枚入×2袋]

(1枚：14cm×10cm)

### 〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話 (0879) 25-2363  
受付時間 9:00～17:00  
(土・日・祝日を除く)



4 987373 028465

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931



発売元

テイコクファルマケア株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

この紙を押すと開きます。