



この添付文書は、お薬とともに保管しご使用の際には必ずお読みください。

皮膚疾患治療薬

第2類医薬品

湿疹・あせも・虫さされに

# 宇津かゆみどめクリーム

宇津かゆみどめクリームは、のびが良く、ベタつかないクリームタイプのかゆみ止めです。

## 特長

- 1 無着色・無香料のクリームです。
- 2 抗炎症作用のある酢酸ヒドロコルチゾン及びグリチルレチン酸、鎮痒作用(かゆみを抑える作用)のあるクロタミトンの働きで、虫さされ、湿疹のかゆみやはれをしずめます。
- 3 血行を促進する酢酸トコフェロール(ビタミンE)、殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールを配合しました。
- 4 赤ちゃんからお年寄りまで、ご家族みんなでお使いになれます。

## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 水痘(水ぼうそう)、水虫、たむし等または化膿している患部
  - (2) 目、口唇等の粘膜の部分や目の周囲
2. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、腫脹、かゆみ
患 部	水虫・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状又は持続的な刺激感、発疹等

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 【効 能】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

(裏面にも必ずお読みください)

## 【成分・分量】

1g中、次の成分を含有します。

成 分	分 量	作 用
酢酸ヒドロコルチゾン	5mg	発赤やはれ等の炎症をおさえます。
グリチルレチン酸	2mg	
酢酸トコフェロール	5mg	血行を促進します。
クロタミトン	50mg	かゆみを抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	かきこわしによる二次感染を防ぎます。

添加物として、パラフィン、ステアリン酸グリセリン、水添大豆リン脂質、カルボキシビニルポリマー、セトステアリルアルコール、アジピン酸ジイソプロピル、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、クエン酸、ソイプロパールアミンを含有します。


### 〈成分・分量に関する注意〉

本剤の使用後、わずかにほてり(熱感)を感じるがありますが、これはクロタミトンによるものです。ごく短時間のうちに消失しますので、ご心配いりません。

## 【使用法】

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

### (チューブの正しい開け方)



キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差し込み、穴を開けてください。

### 〈使用法に関する注意〉

- (1) 定められた使用法を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。(なお、症状が重い場合には、眼科医の指導を受けてください。)
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをきちんと閉めて、外箱に入れて保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

宇津救命丸株式会社 お客様相談室  
TEL 03 (3295) 2681 受付時間/9:00~17:00まで(土・日・祝を除く)

発売元 **宇津救命丸株式会社** 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-3 TEL. 03 (3291) 2661 (代表)

製造元 **ジャパンメディック株式会社** 〒931-8412 富山県山形県168