

殺菌消毒薬

Oronine Solution

オロナイン[®]液

第2類医薬品

【効能・効果】すり傷、きり傷、かき傷、さし傷、
外用専用 靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
80mL 使用期限、製造番号：容器底部に表示

販売 大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田町2-9
お客様相談窓口 ☎03-3293-3212

製造販売元 株式会社大塚製薬工場
徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原1115

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

【用法・用量】

1日数回患部に噴霧
又はガーゼ、脱脂綿に浸して
塗布します。

①小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用してください。

②目に入らないように注意してください。万一、
目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗っ
てください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療
を受けてください。③本剤は外用にのみ使用してください。

④患部やその周囲の汚れを落としてから使用してください。
⑤やけどのような痛みを伴う炎症をおこすことがあるので、溶液の状
態で長時間皮膚と接触させないでください。

【使用上の注意】【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起
こりやすくなる)1.次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジ
ンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。[相談すること]1.次の人は使用前に医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている人②薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人③患部が広範囲の人④温潤やただれのひどい人⑤深い傷やひどい
やけどの人 2.使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、はれ、乾燥、ひびわれがあらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。まれに使用後すぐに、皮
膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、
動悸、意識の混濁等の重篤な症状[ショック(アナフィラキシー)]が起
こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この
製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分】100mL中：クロルヘキシジングルコン酸塩液
(20%)0.25mL、ジブカイン塩酸塩100mg、クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩200mg、ナファゾリン塩酸塩100mg
添加物としてエタノール、精製水を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】①直射日光の当たら
ない涼しい所に密栓して保管してください。②小児
の手の届かない所に保管してください。③他の容
器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)④使用期限をすぎた製品
は使用しないでください。



ボトル
キャップ
バイブ
外装フィルム

325-1P8