

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆい水虫・たむしに1日1回で効く
抗真菌薬 テルピナフィン塩酸塩 + かゆみ止め成分 リドカイン配合

セラミEXクリーム

[みずむしたむし用薬]

第②類医薬品

水虫やたむしは白癬菌（水虫菌）というカビ（真菌）の一種が、皮膚表面の角質層に寄生することによって起こる皮膚病で、皮膚がむけたり、かゆくなったりといった症状が起こります。

治療にあたっては患部を清潔にし、むれないようによく乾燥させ、症状が治まっても角質には白癬菌が潜んでいる可能性がありますので、約1か月間は根気よく治療を継続することが大切です。

セラミEXクリームは皮膚浸透性に優れ、水虫の原因である白癬菌の細胞膜を破壊・殺菌する作用が顕著で、1日1回の使用で24時間効果が持続する抗真菌薬 テルピナフィン塩酸塩に加え、かゆみを抑える局所麻酔薬リドカインを配合したクリーム剤です。特に患部がジクジクしたびらんがある場合に適しています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---|
| 皮 膚 | かぶれ、刺激感、熱感、 <small>りんせつ らくせつ</small> 鱗屑・落屑(フケ、アカ)のような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、いたみ、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん* |

*：全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】


みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

チューブ穴のあけ方（右図）

キャップを逆にして、チューブに強く押し当ててください。



〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

【成分・分量】

1g中 テルピナフィン塩酸塩・・・・・・・・・・10mg
リドカイン・・・・・・・・・・20mg
添加物:ステアリン酸、セトステアリルアルコール、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、トリイソオクタン酸グリセリン、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシロキサン、pH調節剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話 03-3952-0100
月～金曜日 9:00～17:00(祝祭日を除く)



発売元

三宝製薬株式会社

東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元

東光薬品工業株式会社

東京都足立区新田2丁目16番23号