

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

水虫・たむし治療薬

マセトローション T

製品の特徴

マセトローションTは、水虫の原因菌である白癬菌^{はくせんきん}に対する抗菌作用を持つ成分と患部のかゆみや炎症をしずめる成分の配合により、かゆい水虫・たむしにすぐれた効果を発揮します。有効成分の皮膚への浸透を高める基剤をベースとした、皮膚によくなじむ使用感のよいクリームタイプの軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

いんきんたむし、ぜにたむし、みずむし

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100g中)	はたらき
ウンデシレン酸	5.0g	水虫・たむしの原因菌(白癬菌)に対する抗菌作用があります。
トリメチルセチルアンモニウム ペンタクロロフェネート	1.0g	
木槿皮エキス (木槿皮として2.5g)	0.5g	
グリチルレチン酸	0.5g	患部のかゆみや炎症をおさえます。
ジフェンヒドラミン	0.5g	

添加物として、ラウリル硫酸Na、香料、プロピレングリコール、ステアリンアルコール、マクロゴール、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンオレイルエテルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報

水虫・たむしは、カビの一種の白癬菌などが、皮膚表面の角質層に寄生して起こる皮膚病です。白癬菌は足の指のあいだなど湿ったところに寄生しやすく、感染すると激しいかゆみや痛みを伴い、皮膚がふやけたり、水疱を生じたり、逆に硬く厚くなることがあります。二次感染や悪化しやすいため、早めの治療が大切です。

また、症状が消失しても角質層内に白癬菌が生き残っていることが多いため、途中で治療を止めると再発しやすいことも水虫・たむしの特徴です。症状がなくなっても、根気よく治療を続けることが必要です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/