

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

水虫、たむしに1日1回

DHC スアシナクリーム

<水虫・たむし治療薬>

第②類医薬品

DHCスアシナクリームは、4つの作用で患部に多角的にアプローチする水虫・たむし治療薬です。原因菌(白癬菌)を殺菌する成分に加え、かゆみや炎症を鎮める成分を配合。1日1回塗るだけで、水虫・たむしを改善します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2) 湿疹。

(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 乳幼児。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 患部が顔面又は広範囲の人。

(6) 患部が化膿している人。

(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、亀裂、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

■ 用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 1.患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 2.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 3.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 4.外用にのみ使用してください。

■ 成分・分量

100g中

成分	分量	作用
ブテナフィン塩酸塩	1.0g	原因菌(白癬菌)を殺菌します。
クロタミトン	5.0g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g	かゆみ・炎症を抑えます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌作用で清潔に保ちます。
l-メントール	2.0g	清涼感でかゆみを鎮めます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感でかゆみを鎮めます。

添加物として、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、カルボキシビニルポリマー、L-アラギニン、パラベンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

医薬品
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp