

使用前に次の説明を必ずお読みください。

水虫・たむしに 氷の泡で冷却

# ダマリンアイススプレー

第2類医薬品

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

### 次の部位には使用しないこと

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)患部が顔面又は広範囲の人。
- (6)患部が化膿している人。
- (7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い。)

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱

- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合

## 【効 能】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

## 【用 法】 1日1～2回、適量を患部に噴射塗布してください。

### 【注意】

- (1)定められた用法を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)使用前によく振り、真下に向けて噴射してください。
- (7)患部まで約3cmの距離で噴射してください。
- (8)同じ箇所を連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いいため、過度の使用により凍傷になるおそれがあるため)


**【成分】** 80mL 中

ミコナゾール硝酸塩	240mg
リドカイン	480mg
グリチルリチン酸二カリウム	120mg
l-メントール	240mg
dl-カンフル	120mg

添加物：モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン（6E.O.）、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ポリソルベート 65、1,3-ブチレングリコール、エタノール、LPG、DME

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。（品質保持のため）

**火気と高温に注意**

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れていないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高压ガス：LPG・DME

- 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。
- 本品はフロンガスを使用していません。

お客様 119 番室  
電話 03-3985-1180  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

**大正製薬株式会社<sup>41</sup>**

東京都豊島区高田3丁目24番1号

— 本文は、直接容器に記載されている事項です —