

(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

- ご使用にあたって
- 絆創膏の中央部のピンク色の薬を患部に貼り、3～4日間貼り続けて下さい。
  - 台紙からはがす際は、薬がずれないように、患部に貼った状態で絆創膏の上を絆創膏で抑えて下さい。
  - 1回で取れない場合は、2～3日後に再び貼って下さい。
  - 入浴後にご使用になります。
  - 絆創膏に薬のシトミがりますが、効果には変わりありません。

【消費者相談窓口】  
本品に関するお問い合わせは、お買求めのお店又は下記にお願致します。  
お客様相談室  
電話 (03)3441-5191  
受付時間 9:30～17:00  
(土、日、祝日を除く)

平成 24 年 2 月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

この説明文書は、服用前に必ずお読み下さい。  
また、必要時に読めるよう保管して下さい。

## トリクロ。(EXCLAVIL) 第2類医薬品

サリチル酸が、硬く厚くなった皮膚を柔らかくして、ウオの目、タコ、イボを取り去ります。

### ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

(1)目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の回り等)、顔面等。(2)炎症又は傷のある患部。

### 🗨 **相談すること**

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)乳幼児。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

### 【効能・効果】

ウオの目、タコ、イボ、手足のソコマメ

### 【用法・用量】

局部に膏面を内側にして貼る。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

(2)外用にのみ使用すること

(3)患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用すること

### 【成分・分量】

本品は日局絆創膏の中央に半径4.5mmの円形状に下記の成分を含むものを貼載する。

有効成分：サリチル酸 30.8mg

添加物：ゼラチン、グリセリン、エタノール、精製水

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること

(2)小児の手の届かない所に保管すること

製造販売 

原沢製薬工業株式会社  
東京都港区高輪3丁目19番17号

SI5S23①