

新イボサルバン うおの目・たこ・いぼ

押して開ける

使用上の注意

【してはいけないこと】
 (すらないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 次の部位には使用しないで下さい
 (1)自分の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の周り等)、顔面等。
 (2)炎症又は腫瘍のある部位。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1)乳幼児。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持ちて医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関節部位	症 状
皮 膜	発疹・発赤・かゆみ

3. イボへの使用につきましては、表面がザラザラした硬い角質化したイボにご使用下さい。他のイボについては医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【用法・用量】被覆してある剥離紙をはぎ取り、中央部のサリナル酸鋅創膏が患部を覆うように貼り付け下さい。

【用途及び用量に関する注意】

- (1)小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2)患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用して下さい。
- (3)患部を清潔にして、1日毎に自方に交換し、入浴時は必ず取りはずして下さい。
- (4)交換の際は、はがれやすく、白く軟化した表面の角質部を消毒したピンセット等で取り除いて下さい。
- (5)うおのめ、たこを取った後、患部に痛みがあるようでしたら、救急絆創膏等で処置して下さい。(化粧したり痛みがひどい場合は皮膚科医に相談して下さい)

【効能・効果】うおのめ、たこ・いぼ
 【成分・分量】膏体100g中 サリナル酸5.0g
 添加物として、精製ラノリン、ポリブテン、生ゴム、エヌテルガムを含みます。
 また、構成として、綿、天然ゴム、タルベーツ液化水素樹脂、ポリブテン、ビニン・ジベンテン共重合体、酸化亜鉛、ポリエチレン、アクリル酸エチステル共重合体を含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所
 に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。



4 954007 060665

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



新イボサルバン うおの目・たこ・いぼ




第2類医薬品

第2類医薬品
16枚入




うおの目・たこ・いぼ
新イボサルバン



使用期限

製造番号

実物大



IBOSARLBAN

ずれにくい
絆創膏

新イボサルバン

うおの目 たこ・いぼ

薬効部分の直径 8mm

刺激をガードする保護パッド

粘着力の強い布地絆創膏

16枚入 第2類医薬品

製造販売元 明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

第2類医薬品
16枚入



うおの目・たこ・いぼ
新イボサルバン