

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

皮ふ軟化薬



この腕などのぷつぷつ・ざらざらサメ肌をなめらかに

メンソレータム®

第3類医薬品

ザラプロ


二の腕や太もものぷつぷつ・ざらざらの原因って？

露出が増えると気になる二の腕や太もものぷつぷつ・ざらつき。

それは皮ふ表面が気付かないうちに乾燥することで角質が厚く硬くなるのが原因です。乾燥して硬くなった皮ふはぷつぷつやざらつきを感じやすく、見た目も気になりがち。

そんな肌には水分を与えるだけではなく、硬くなった角質を柔らかく整えることが大切です。

「メンソレータムザラプロ」は硬くなった角質を柔らかく導く尿素10%のほか2種類の有効成分を配合し、ざらつくさめ肌を見たり手触りの気にならない、なめらかな素肌へ導きます。



まずは **2週間** お使いください！

角質層のターンオーバーは約2週間とされています。

ぷつぷつ・ざらざらのケアもターンオーバーに合わせて、

2週間継続してお使いいただくことをおすすめします。

適量を患部にしっかりお使いいただき、見た目や手触りの気にならない肌へ！

ぷつぷつ、ざらざらには正しいケアを！



× 石鹸や
ボディソープで
ゴシゴシ洗う



× ぷつぷつ、ざらざらが気になって
ひっかいてしまう

体を洗うすぎたり、こすりすぎると皮ふのバリア機能を損なう可能性も。

体を洗う際は力をいれてこすりすぎないように注意しましょう。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目のまわり、粘膜等 (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
(3) かさぶたの様に皮フがはがれているところ (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、かさぶたの様に皮フがはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

さめ肌、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、小児の乾燥性皮ふ、老人の乾皮症

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 外用にのみご使用ください。

成分(1g中)

有効成分	分量	働き
尿素	100mg	角質を柔らかくする
グリチルリチン酸二カリウム	5mg	炎症を抑える
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、患部の修復を促進

添加物として、サリチル酸、ビタミンC、流動パラフィン、ステアリアルアルコール、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、乳酸Na、トリエタノールアミン、グリシン、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、エト酸Na、パラベン、香料を含有する

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しいところに密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かないところに保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先; お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またはご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401264402