

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

皮ふ軟化薬


アスコートAD

第2類医薬品

背中やおしり、足などの広い面積の皮ふが乾燥すると、カサカサして白くなったり皮ふ表面がウロコのくずみたいになってパラパラ落ちるし、イライラするぐらいかきむしりたくなって、つらいですよね。水仕事の多い方、冷たい風によくあたる方、お年寄りや小児にも多いこの肌の乾燥状態はドライスキンと呼ばれます。そんな時、アスコートADをしっかりとすり込んでください。かゆみを抑える成分が配合されていますので、かゆみがスーとひいて楽になります。また、尿素には右のように角質の水分を保持する作用、角質を溶解し剥離する作用があり、さらっとなめらかな皮ふにしてくれます。


乾燥してつらい季節には、アスコートADで早めにお手入れしてくださいね。

①尿素の角質水分保持作用



クリーム内やからだの水分を効率よく皮ふ表面の角質層に取り込み保持するので、皮ふがみずみずしくなります。

②尿素の角質溶解剥離作用



白くカサカサした皮ふ表面からパラパラ落ちる隙間を取り除き、皮ふがしっとりなめらかになります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひび割れ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮ふがはがれているところ。
- (4) 炎症部位。（ただれ、赤く腫れているところ。）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師による治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、ぴりぴり感）、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

効能・効果

かゆみをともなう乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量 (100 g 中)

成 分	含量	は た ら き
尿 素	10.0 g	角質層に水分を取り込み保持する作用により、皮膚にしっとり感を与えます。また、乾燥してカサカサになった角質層表面をなめらかにします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	抗ヒスタミン作用により、不快なかゆみやチリチリする感じを取り除きます。炎症をおさえる効果もあります。
d-カンフル	1.0 g	局所をスーとさせて、かゆみや炎症をしずめます。また、血行を改善する作用のあることもわかっています。
リドカイン	2.0 g	かゆみの刺激が伝わるのを阻止するのでイライラするかゆみを楽にしてくれます。
トコフェロール酢酸エステル	0.3 g	末梢の血行を促して、皮膚表面に十分な酸素・栄養素の供給が促進されます。皮膚表面の新陳代謝が活発になり、すこやかな皮膚が生まれます。

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

(包 装) 90 g ジャー入り

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元



株式会社 カイゲン
大阪市中央区道修町2丁目5番14号

製造販売元



万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142