

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

皮ふ軟化薬

〈尿素10%配合〉

第3類医薬品

ムーゲホワイト

皮ふがあれ、カサカサしてくるのは皮ふの表面にある角質層に含まれている水分が不足しているのが原因です。ムーゲホワイトの有効成分である尿素が内面より角質層への水分の補給を増加し、又クリーム中の水分が外面より吸収されて、乾燥した皮ふをみずみずしく回復させます。

水仕事などで手指がカサカサしているときに、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしなどが黒ずんでかたくなったときに、お年よりの乾いた皮ふに、お子様のカサカサの皮ふに、よくすり込んでお使いください。

 使用上の注意


してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 粘膜(口腔、鼻腔など)、目の周囲
 - (2) 傷口又は赤くはれている部位
 - (3) ただれやひび割れのひどい部位



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、びりびり感)、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

● 成分・分量(100g 中)

尿素 10.0g

添加物としてグリセリン、ステアリン酸、セタノール、サラシミツロウ、精製ラノリン、マクロゴール400、マクロゴール4000、プロピレンジコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、水酸化K、パラベン、イソプロピルメチルフェノールを含有します。

● 用法・用量

1日 2~3回 適量を塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

● 効能・効果

手指のあれ、老人の乾皮症、小児乾燥性皮ふ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、さめ肌

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

○ お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部
電話(0798)42-6940(代表)
受付時間 月~金曜日 9:30~17:00
(祝祭日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木 3-46-16
製造販売元
六陽製薬株式会社
兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-63