

目薬

目のつかれ・目のかすみに

新スマリンデラックス

NEW SMARIN® DELUXE

新スマリンデラックスは、目のつかれを改善する活性型ビタミンB₂ (FAD) や、目のかすみの原因となる炎症に効果をあらわすイプシロナーアミノカプロン酸 (EACA) などを配合した、ソフトなさし心地の黄色い目薬です。



○透明袋入り

この製品の容器は、品質保持のため、透明な袋に入っています。

※携帯用の袋は入っておりません

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合。
- (3) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

- 目のつかれ、目のかすみ（目やにの多いときなど）
- 結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）
- 紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）
- 眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

■ 用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼します。

* 目薬をさすときは、容器の先端が、まつ毛や目のふちに触れないよう気をつけ、指で下まぶたを引き、1滴ずつ落としてください。



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先がまぶた、まつ毛に触れないようにしてください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

■ 成分と作用

成分 (15mL中)	作用
フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム (FAD-活性型ビタミンB ₂)・7.5mg	目に栄養を与え、新陳代謝をたすけるビタミンが、つかれた目をスッキリさせます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)……………15mg	
ネオスチグミン メチル硫酸塩……………0.75mg	目の調節機能に作用し、つかれて低下した目のピント合わせをスムーズにして目のつかれを緩和します。
イプシロン-アミノカプロン酸 (EACA)……………300mg	抗炎症作用+抗ヒスタミン作用で、目のかすみの原因となる結膜充血、眼炎といった目の不快な症状をしずめます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩……………1.5mg	
グリチルリチン酸 二カリウム……………7.5mg	

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、パラベン、クロロブタノールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 成分の結晶が容器の先につくことがあります。清潔なガーゼなどで軽くふき取ってから使用してください。
- (6) 本剤は黄色の目薬ですから、衣服などにつけないよう注意してください。もし衣服などについたときは、すぐに水で洗い落としてください。
- (7) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>