

使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

眼科用目薬

目の疲れ・かすみ・充血に マインディ目薬

第3類医薬品

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)

L-アスパラギン酸Mg・K配合

現代社会では、テレビ、新聞、パソコン、ワープロ、車の運転など目を酷使する機会が多くなっています。

その結果、目の疲れ、目のかすみ、充血などの症状を訴える人が老若を問わず増えてきています。

マインディ目薬は、赤い色のビタミンB₁₂をはじめビタミンEやビタミンB₆などの6種類の有効成分を配合した目薬で、目の組織の血流を良くし、栄養の補給を助け、目の酷使による症状を改善してくれます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は、使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。
 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかゆみ、ハードコンタクトレンズを装着している時の不快感

用法・用量

1回2~3滴、1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものには使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

本製品は、1mL中に次の成分・分量を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
シアノコバラミン(ビタミンB12)	0.1mg	目の調節機能を高め、目の疲れに効きます。
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.5mg	末梢の血行を良くして、栄養の補給を助けてます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.5mg	たんぱく質と脂肪の代謝を助けてます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg	目のかゆみをやわらげます。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	10mg	目に必要な栄養を与え、Mg・Kを補給します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	5mg	角膜の水分を保持し、乾燥を防止してくれます。

添加物：ホウ酸、ホウ砂、クロロブタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、メントール、ポリソルベート80を含有しています。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとつてから使用してください。
- (7) 本製品の赤色は「シアノコバラミン(ビタミンB12)」の色です。赤色の液が衣服などにつかないよう、十分注意してください。点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。

本製品に関するお問い合わせは

佐賀製薬株式会社へお願いします。

佐賀県三養基郡基山町大字小倉481

TEL 0942-92-5656 FAX 0942-92-2253

電話受付時間:月~金(祝日を除く)9:00~17:00

発 売 元 京都薬品ヘルスケア株式会社 京都市中京区西ノ京月輪町38番地
製造販売元 佐賀製薬株式会社 佐賀県三養基郡基山町大字小倉481