

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

目薬

第3類医薬品

## 目の疲れ・目のかすみに ワコール®目薬

パソコン、スマートフォンの使用や車の運転等で、目を使う機会はとて多くなっています。このようなとき、「ワコール目薬」の有効成分が目に栄養を補給し、目の疲れ、目のかすみにすぐれた効果を発揮します。

### ⚠ 使用上の注意



#### 【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人  
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
(1) 目のかすみが改善されない場合  
(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

### 【効能効果】

目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## 【用法用量】

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

### <用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用에만使用して下さい。

## 【成分分量】

100mL中

成分	分量	はたらき
シアノコバラミン (ビタミンB <sub>12</sub> )	10mg	視神経の働きを整え、目の疲れ等に効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	100mg	目の新陳代謝を促進し、目の疲れや眼病予防に効果的に働きます。
タウリン	300mg	傷ついた目の組織修復を助け、眼病を予防します。

添加物としてホウ酸、ホウ砂、塩化ベンザルコニウム、*l*-メントール、*d*-ボルネオール、ゲラニオール、プロピレングリコールを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。  
(使用期限の範囲内であっても、開封後はなるべく早くご使用下さい。)
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



**滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879