



ゼリア新薬

目のかゆみ、目の充血に

エゼット[®]A

眼科用薬

【特徴】

- エゼットAは、カミツレ由来の抗炎症成分アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）を配合した青紫色の眼科用薬です。
- W（ダブル）の抗炎症成分（水溶性アズレン、イプシロン-アミノカプロン酸）と抗ヒスタミン剤の働きにより、目の充血やかゆみを抑えて、不快な症状を改善します。
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが、角膜の乾燥を防いで目を保護します。
- 清涼化剤を配合していないソフトなさし心地の目薬です。

**使用上の注意****相談すること****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎（まぶたのただれ）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

【用法・用量】

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

（必ず裏面もお読みください）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4)点眼用にのみ使用してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)液色は成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

〔成分〕

成分	分量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（水溶性アズレン）	0.02%	目のかゆみ・目の充血をとり除きます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%	
イブシロン-アミノカブロン酸	3.00%	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.10%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。

添加物：ホウ酸、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、pH調節剤

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になり品質が変わることがあります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)成分の水溶性アズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。
- (6)品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をピニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (8)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00~17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

エーゼットはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

J11N
エーゼットA