



ゼリア新薬

目の疲れ・充血に

第2類医薬品

**ジクタークールα**

眼科用薬

**【特徴】**

- ジクタークールαは、疲れ目や紫外線による目の炎症などダメージを受けた腫を改善する点眼薬です。
- 一日中パソコンに向かっていた時の疲れ目や、スポーツをしていて紫外線を目に浴びた時、スイミング後の眼病予防などにご使用いただけます。
- 2つの栄養成分（ビタミンB<sub>6</sub>とパンテノール）が新陳代謝を促して目の疲れをいやし、硫酸亜鉛水和物が目の炎症を抑えます。
- 無色澄明な点眼液で、スキッとした清涼感が瞳に広がります。

**使用上の注意****相談すること****1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (4)次の診断を受けた人。  
緑内障

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

**3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)目のかすみ改善されない場合。
- (2)5～6日間位使用しても症状がよくなる場合。

**【効能・効果】**

目の疲れ、結膜充血、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

**【用法・用量】**

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

**（必ず裏面もお読みください）**

## 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用にのみ使用してください。


## 〔成分〕

成分	分量	はたらき
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB <sub>6</sub> )	0.1%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発にして目の疲れをいやします。
パンテノール	0.1%	
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	目の調節神経に直接作用して、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れに効果を示します。
塩酸テトラヒドロソリン	0.025%	拡張した血管を収縮させ、目の充血を取り除きます。
硫酸亜鉛水和物	0.1%	収れん作用により目の炎症を抑えます。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	0.1%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。

添加物：ホウ砂、クエン酸水和物、ε-アミノカプロン酸、l-メントール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、塩化ポリドロニウム、エドト酸ナトリウム水和物、乾燥亜硫酸ナトリウム、エタノール、pH調節剤、等張化剤

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

シクターはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

**ゼリア新薬工業株式会社**

東京都中央区日本橋小舟町10-11

J11N  
シクタークールα