

2008年12月改訂

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

目の疲れ・充血に

目薬

# 新V・ロングアイ

「新V・ロングアイ」は、さわやかな清涼感のある目薬で、目の調節機能改善成分、充血除去成分、抗アレルギー成分を配合し、目の疲れ、充血、かゆみに効果をあらわします。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

(2) 目のかすみが改善されない場合

(3) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。

〔効能・効果〕

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（必ず裏面もお読みください）

〔成分・分量〕

成 分	含 量 (100mL中)	は た ら き
ナファゾリン塩酸塩	3mg	交感神経末梢を刺激して、末梢血管を収縮し、結膜の充血を取り除きます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	毛様体筋に作用して、目の調節機能を高め、目の疲れ、かすみ目を改善します。
アラントイン	100mg	抗炎症作用、肉芽形成作用、組織修復作用により、結膜の炎症や充血を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	抗炎症作用、組織修復作用により、炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症を抑えます。
パンテノール	100mg	毛様体・虹彩細胞の代謝を促進し、目の疲れを改善します。

添加物として、リン酸二水素Na、ホウ酸、エデト酸Na水和物、等張化剤、プロピレングリコール、ポリソルベート80、濃ベンザルコニウム塩化物液50、l-メントール、d-ボルネオール、dl-カンフル、グラニオール、pH調整剤を含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様すり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10  
電話：076-478-5580 受付時間：9：00～16：00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元

TOA

東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10