

使用前にこの説明文書を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

目薬  
目のつかれ、目のかすみに

# アイムードE40

アイムードE40は、天然型ビタミンE（酢酸d-α-トコフェロール）を配合した目薬で、初老期からはじまる「目のかすみ」「目のつかれ」等の症状をやわらげます。また目の調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、充血やかゆみ等の症状を取り除くイブソロニアミノカプロン酸等の成分を配合した、お役に立つ目薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

### 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼すること。

（裏面に続きます）

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4) 点眼用にのみ使用すること。
- (5) 用法・用量を守ること。

組成と作用 100mL中に次の成分を含む

成 分	100mL中	主 な 作 用
酢酸 d - α - トコフェロール	50mg	水晶体の老化を防ぎ、新陳代謝を活発にします。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピントを調整し、疲れ目やかすみ目を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、目の炎症や目のかゆみ、不快感を除きます。
グリチルリチン酸二カリウム	50mg	抗炎症作用、抗アレルギー作用があり、目のかゆみ、はれ、ただれを和らげます。
イブシロン-アミノカプロン酸	1000mg	出血症状、炎症、アレルギー症状を改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	角膜を保護し、目に潤いを与えます。
タウリン	100mg	目に栄養を与え、代謝を促して疲れ目を改善します。

添加物としてクロロブタノール、パラベン、l-メントール、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、d-ポルネオールを含有する。

### 〈成分に関する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じことがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出ることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
  - (3) 他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わること)。
  - (4) 他の人と共用しないこと。
  - (5) 表示の期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。
- ※ 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないこと  
(容器が変形することがある)。

お問い合わせ先

田村薬品工業株式会社 お客様相談室

06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

販売元 田村薬品工業株式会社  
大阪市中央区道修町2-1-10

製造販売元 中新薬業株式会社  
富山県滑川市上小泉504-2

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)