

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

# 目薬

# 目のつかれ 充血 眼病予防

第3類医薬品

ピタール目薬

## △ 使用上の注意

### 相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人  
緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 目のかすみが改善されない場合
  - 2週間位使用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴 点眼して下さい。

#### <用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を守って下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- 点眼用에만使用して下さい。



容器の先をまぶた、まつ毛に触れないようにしましょう

裏面もお読み下さい

成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	目のピントを調節する機能に作用し、目の疲れ、目のかすみを改善します。
イブシロン-アミノカブロン酸	1000mg	抗炎症・抗アレルギー作用により、目の充血をとり、炎症をしずめ、かゆみを抑えて、不快な症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	
ピリドキシン塩酸塩	100mg	目に栄養をあたえ、新陳代謝を促進して、目の疲れを和らげます。
タウリン	1000mg	
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	目の乾燥を防いで、目を保護し、眼病を予防します。

添加物としてクロロブタノール、パラベン、エデト酸Na水和物、D-マンニトール、L-メントール、d-ボルネオール、ホウ酸、塩化Na、エタノールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

※ 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。(容器が変形することがあります)


副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121 内線 57(開発部)

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社  
富山県滑川市上小泉504-2