

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

目の疲れ、充血、かゆみに

エース ロートA

目 薬

エースロートAは、5つの成分が目の疲れ、充血、かゆみなどの諸症状にすぐれた効果目をあらわす、キリッとさわやかなさし心地の目薬です。

特 長

- ①目の疲れにすぐれた効果を発揮します。
目の調節神経に直接作用して、ピント調節をスムーズにするネオスチグミンメチル硫酸塩、細胞に栄養を与え、新陳代謝を活発にするL-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)の配合で、目の機能回復を助け、目の疲れを改善します。
- ②充血をすっきり取り除きます。
ナファゾリン塩酸塩の血管収縮作用によって結膜充血を取り除き、目の炎症を鎮めます。
- ③眼病を予防し、アレルギーなどによる目のかゆみなどの不快症状を改善します。
水泳のあとやほこり、汗などによる眼病を予防するとともに、抗炎症剤アラントイン、抗ヒスタミン剤クロロフェニラミンマレイン酸塩の働きで炎症をしずめ、アレルギーなどによる目のかゆみ、充血などの不快症状も改善します。



【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い
3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■効能

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

■用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあるので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



目やまつ毛が
ふれることの
ないように


■成分・分量

有効成分	配合量
Ｌ-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	2%
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%
アラントイン	0.3%
ナファゾリン塩酸塩	0.003%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.02%

○添加物として、ホウ酸、ℓ-メントール、d-カンフル、ベルガモット油、d-ボルネオール、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、
高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに答えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1