

2008年6月改訂

〔果糖・糖漿〕

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

ものもらい・結膜炎に

目薬

バラードS

第2類医薬品

目に細菌が感染すると、目やにがでたり、目が充血したり、目のふちがただれたりすることがあります。

バラードSは、これらの細菌に対して強い抗菌作用をもつスルファメトキサゾールを主成分としています。また、漢方薬の原料としてよく用いられている甘草の有効成分（グリチルリチン酸二カリウム）が目の炎症を鎮めるのにすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります〕
長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目 | 充血、かゆみ、はれ |

(2) 3～4日間使用しても症状がよくなる場合

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
3. ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
4. 点眼用にはのみ使用してください。

(必ず裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

＜「ものもらい」についての注意＞

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。（なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足等で体力が低下しているときに起こりやすいので疲労をさけ、睡眠を十分とるよう心掛けてください。）

〔成分・分量〕

| 成分 | 分量 (100mL中) | はたらき |
|---------------|----------------|---------------------------------------|
| スルファメトキサゾール | 4 g | 持続性のサルファ剤で、ブドウ球菌、連鎖球菌などに対して抗菌作用を示します。 |
| グリチルリチン酸二カリウム | 200mg | 抗アレルギー作用・抗炎症作用により、炎症を鎮め、また目のかゆみを抑えます。 |

添加物：ホウ酸、ホウ砂、パラベン、チオ硫酸Na水和物、pH調整剤

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じる場合があります。これは成分のグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通して口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
6. 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用してください。

〔量用・志用〕

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
電話：076-478-5580 受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元 **TOA** 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10