

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時にすぐ読めるよう大切に保管してください。

# アイリッチ モイスロック

15mL

第3類医薬品

眼科用薬

## 特徴

### ●涙の組織成分である7つのイオンをバランスよく配合。


涙に近い製剤設計をした涙感覚の目薬です。  
目にうるおいを与え、目の疲れを軽減します。

### ●疲れた瞳に栄養

アミノ酸であるL-アスパラギン酸カリウムや  
涙に含まれる栄養成分(ブドウ糖)が、疲れた目  
を癒します。

### ●刺激の少ないやさしいさし心地

### ●すべてのコンタクト(ハード・ソフト・O<sub>2</sub>・使い捨て)に 対応。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

- (4) 次の診断を受けた人。

緑内障

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に ご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

#### 3. 次の場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は 登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

## 効能・効果

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛などに触れさせないでください(目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用にのみ使用してください。

## 成分 (100mL中)

L-アスパラギン酸カリウム……………	120mg	ブドウ糖……………	5mg
塩化ナトリウム……………	733mg	塩化カリウム……………	127mg
塩化カルシウム水和物……………	15mg	硫酸マグネシウム水和物……………	10mg
リン酸水素ナトリウム水和物……………	273mg		

添加物として乾燥炭酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物液を含有しています。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光をさけ、なるべく涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。開封後、長く放置すると濁りや変質のおそれがありますので、注意してください。
- (6)保存状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

## お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記までお願い申し上げます。

**佐賀製薬株式会社** お客様相談窓口

電 話： **0942-92-5656**

受付時間： 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉 481