

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダスト等による目のアレルギー症状(目のかゆみ・充血)の緩和に

ケトチフェンフマル酸塩 配合

**ストアイズZ**

第2類医薬品

## 特徴

- 医療用で抗アレルギー剤として使用されているケトチフェンフマル酸塩を医療用と同じ分量で配合したすぐれた効き目のアレルギー専用点眼薬です。
- ケトチフェンフマル酸塩の3つの作用が症状を改善します。
  - 1) アレルギーを引き起こす化学物質の放出を抑えることにより花粉やハウスダストなどによる目のアレルギー症状を鎮めます。
  - 2) ヒスタミン受容体をブロックし、既にかこってしまったアレルギー症状を抑えます。
  - 3) 抗炎症作用により目の充血・目のかゆみを改善します。
- アレルギー症状を起こした目にさわやかな清涼感を与えます。



## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 1才未満の小児

#### 2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
- (5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人  
 とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。
  - ・ 片方の目だけに症状がある場合
  - ・ 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
  - ・ 視力にも影響がある場合
  - ・ 目やにの多い場合
- (6) 妊婦又は妊娠していると思われる人

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	かゆみ**、発疹
目**	目の充血、刺激感*、痛み*、はれ*、かゆみ*、目のかすみ、目の乾燥、目がまぶしい
その他	眠気、頭痛、口のかわき

\*目のまわりを含みます。

\*\*人によっては、使用開始初期(1~2日目)にまぶた、目の周囲、頬などにひどいかゆみ、はれ、痛みなどの症状があらわれることがあります。

#### 3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 1週間使用しても症状がよくならない場合

#### 4. 次の場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

1回1〜2滴,1日4回(朝・昼・夕方及び就寝前)点眼してください。

### [用法・用量に関連する注意]

- (1) 花粉など季節性アレルギーによる目の症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めた後、症状の軽い早い時期からの使用が効果的です。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (5) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがありますので、注意してください。又、混濁したものは使用しないでください。
- (6) コンタクトレンズの装着液として、又、コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (7) 点眼用にのみ使用してください。

## 成分・分量

有効成分	含有量(100mL中)	はたらき
ケトチフェンフマル酸塩	69mg	抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用、抗炎症作用の3つの作用を持ち、アレルギー誘発物質の放出を抑えます。

添加物：グリセリン、ベンザルコニウム塩化物、d-ボルネオール、l-メントール、pH調節剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、涼しい所にキャップをきちんと閉めて保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下や強い光の下に放置したりすると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
- (4) 汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。又、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。開封後、長く放置すると濁りや変質のおそれがあるので、注意してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎(06)6351-2100(代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

発売元

 **奥田製薬株式会社**  
大阪市北区天満1丁目4番5号  
<http://www.okudaseiyaku.co.jp>

製造販売元

**佐賀製薬株式会社**  
佐賀県三養基郡基山町小倉 481

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎フリーダイヤル 0120(149)931