

鼻炎用内服薬

スカイナー[®]鼻炎N

第2類医薬品

アレルギー性鼻炎や急性鼻炎などによる「くしゃみ、鼻みず、鼻づまり」などの鼻炎症状は、鼻粘膜の炎症によって起こります。

スカイナー鼻炎Nは、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえるd-クロルフェニラミンマレイン酸塩に鼻粘膜の炎症時に組織修復を促進するリゾチーム塩酸塩や過剰な鼻みずをおさえるベラドンナ総アルカロイドなどを配合し、鼻炎症状によく効きます。

スカイナー鼻炎Nは、飲みやすい小型カプセル剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる]

- ① 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください。



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
緑内障、心臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化します

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれます
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれます

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

④5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

次の量を**食後**に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル 	1日3回
小児(15歳未満)	 服用しないこと	

[カプセルの取り出し方]

右図のように、カプセルの入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、カプセルを取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分と働き

成人1日量3カプセル中に次の成分を含みます。

成 分	含 量	働 き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	過剰な鼻みずをおさえます
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	鼻粘膜の炎症時の組織修復を促進します
無水カフェイン	150mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます

[添加物]

カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑤使用期限内であっても内袋(アルミの袋)を開封した後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の開封口の「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ「お客様ホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**

受付時間/平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00)

携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品の内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3