

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鼻炎用内服薬

ペアコール[®]鼻炎カプセルLG

くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、頭重などは、鼻炎や副鼻腔炎によってあらわれ、気分がすぐれないばかりか、睡眠不足や過労、集中力や根気力の低下など、日常生活も不快にします。

ペアコール[®]鼻炎カプセルLGは、抗ヒスタミン剤の中で眠気の少ないd-ケロルフェニラミンマレイン酸塩を配合し、これらの諸症状を速やかに緩和して、効き目をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)次の症状のある人。

前立腺肥大による排尿困難

(3)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)授乳中の人は。

(4)高齢者。

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。

(7)次の症状のある人。

高熱、排尿困難、むくみ

(8)次の診断を受けた人。

緑内障、腎臓病

(9)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

6カプセル（大人の1日量）中

成 分	含 量	はたらき
塩酸プロソイドエフェドリン	180mg	鼻粘膜の充血や腫れを抑え、鼻づまりを改善します。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	4mg	眠気の少ない抗ヒスタミン剤で、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状をすみやかに鎮めます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	粘液の分泌を抑え、鼻みずやなみだ目を改善します。
グリチルリチン酸	60mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状をすみやかに鎮めます。
無水カフェイン	120mg	脳血管に働いて、頭重を鎮めると共に、眠気を防ぎます。

添加物：バレイショデンブン、乳糖、セルロース、ステアリン酸Mg、青色1号、赤色3号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、ゼラチン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- 1) 購入した薬局、薬店
2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報部

TEL 0744-28-0021

受付時間 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

®:登録商標

サンドラッググループ[®]

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市觀音寺町9番地の2