

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。


1日2回のコンタック

CONTAC[®]

コンタック[®] 600ST

コンタック 600STは1日2回(朝・夕それぞれ1カプセル)の服用で、かぜのひきはじめによくみられる急性鼻炎やアレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの症状にすぐれた効き目を発揮します。また、のどの痛みや鼻粘膜の炎症をおさえ、なみだ目、頭が重いなどの症状にも効果的です。

〈模式図〉



速放性粒

腸溶性粒

コンタック600STの中には胃酸により分解されてしまう成分が配合されています。この成分を胃酸から保護するために、顆粒の表面に胃で溶けない被膜をかけた腸溶性顆粒も配合しています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、血液凝固異常(出血傾向)
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病、肝臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘

【効 能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】

下記の1回量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回(朝・夕)
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- カプセルの取り出し方：図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強くおして裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分と作用】

2カプセル(1日量)中に次の成分を含んでいます。

(U:単位)

成 分	含 量	作 用	
抗 分 泌 剤	ヨウ化イソプロバミド	5mg	鼻汁・なみだの過剰な分泌を抑えます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	アレルギー症状(鼻みず・くしゃみ・なみだ目・鼻づまり)を抑えます。
消炎酵素剤	ブロメライン	80000U	鼻粘膜やのどの炎症を抑え、鼻づまり、のどの痛みを改善します。

添加物：ヒプロメロース、白糖、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ポビドン、赤色3号、黄色5号、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート80、マクロゴール、シヨ糖脂肪酸エステル、ゼラチン

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限*(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

*使用期限とは、内袋(アルミの袋)を未開封の状態での使用期間をあらわします。

【お問い合わせ先】

- 購入した薬局・薬店
- グラクソ・スミスクライン株式会社
コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談室
【電 話】03-5786-6315
【受付時間】9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
- 上記以外の時間で、誤飲、誤用、過量使用等の緊急のお問い合わせは下記機関もご利用いただけます。
連絡先：(財)日本中毒情報センター 中毒110番
電 話：072-727-2499(24時間対応)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、PCや携帯電話から contac.jp へ