



アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などの鼻づまり・鼻みずに

**パブロン点鼻JL**

第2類医薬品  
(点鼻薬)

- ◆パブロン点鼻JLは、有効成分が霧状の微粒子となって鼻の奥深くまで均一にいきわたります。その後、薬液が炎症患部でジェル化し、長くとどまります。
- ◆塩酸テトラヒドロソリン、クロルフェニラミンマレイン酸塩配合で鼻粘膜のはれや充血、アレルギー症状をおさえ、鼻づまり・鼻みず等の不快な鼻炎症状を効果的に改善します。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用が起こりやすくなります)  
長期連用しないでください



### 👤 相談すること

#### ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

#### ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

#### ③ 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



## 効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)



## 用法・用量

1回に1～2度ずつ鼻腔内に噴霧します。なお、3時間以上の間隔をおいて、1日6回まで使用できます。

年齢	1回	使用回数
成人(15才以上)及び7才以上の小児	1～2度ずつ鼻腔内に噴霧します	1日6回まで
7才未満	使用しないこと	


### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)点鼻用のみ使用してください。

### 【使い方】



携帯に便利な  
定量噴霧容器  
です。



- ★最初にお使いになる時は、液が出るまで数回空押しを行ってください。
- ★噴霧時は、容器を横にしないでください。
- ★ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですでおやめください。



## 成分

100mL中

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	0.1g	鼻粘膜のはれや充血をおさえ、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
ベンゼトニウム塩化物	0.004g	鼻粘膜の細菌の増殖をおさえます。

添加物：ジェランガム、エドト酸Na、ポリソルベート80、クエン酸Na、クエン酸、パラベン、グリセリン、*l*-メントール、エタノール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく  
はやく使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)