

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第2類医薬品

ACOOP クミアイ
鼻炎スプレー
鼻炎用点鼻薬

特 徴

- 霧状の小さな粒子が鼻の奥まで均一に広がり、つらい鼻炎症状をすばやく緩和するスプレー式の点鼻薬です。
- 鼻粘膜の充血やはれをおさえることで、鼻の通りを改善するとともに、鼻づまり、鼻水、くしゃみといったアレルギー症状を緩和します。
- ミントの香りで、爽快感があり、鼻がスッキリします。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

用法・用量

次の量を、鼻腔内に噴霧してください。

年齢	1回量	使用回数
15歳以上	1～2度ずつ	3時間以上の 間隔を置いて、 1日6回まで
7歳～14歳		
7歳未満	使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)点鼻用にのみ使用してください。

容器の使用方法



使用にあたっての注意

- 最初にお使いになる時は、容器の先端部を上に向けて、液が出るまで数回空押しを行ってください。
- 噴霧する時は、容器を下向きや横向きにしないで、必ず上向きでご使用ください。
- 容器の先端部を針などで突くと、折れたとき大変危険ですので、おやめください。



成分・分量 100mL中

成分	含量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜のはれや充血をおさえ、鼻の通りをよくして鼻づまりを改善します。
クロルフェニルマレイン酸塩	500mg	鼻づまり、鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻粘膜を殺菌し、鼻づまりなどの緩和を助けます。
塩酸リドカイン	500mg	鼻粘膜の痛みやかゆみなどの不快感をやわらげます。

添加物として、エデト酸Na、グリセリン、*l*-メントール、クエン酸、クエン酸Na、マクロゴール、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930