

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。


鼻炎用点鼻薬

ユトラ鼻炎スプレー

第2類医薬品

- [特長]**
- ・鼻腔内に直接噴霧することにより、すばやい効果をあらわし、良く効きます。
 - ・使いやすいスプレーポンプタイプで、一定量が霧状に広がります。
 - ・急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった症状に最適です。

〔ご使用方法〕



- *スプレー使用時は、容器を横にししないで下さい。
- *使用後は、先端部をガーゼ等でふいて下さい。
- *キャップ、ストッパーをして保管して下さい。

用法・用量

成人（15才以上）は1回に1～2度ずつ鼻腔内に噴霧して下さい。
なお、3時間以上の間隔をおいて1日6回まで使用できます。

- 用法・用量をお守り下さい。
- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 本剤は点鼻用にのみ使用して下さい。

⚠ 使用上のご注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重

成分・分量

本品100mL中

成分	分量	作用
ナファゾリン塩酸塩	50mg	血管収縮作用を有します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状を改善します。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	殺菌・消毒の作用があります。
リドカイン	300mg	局所麻酔作用があり、痛みを取り去ります。

添加物として、プロピレングリコール、グリセリン、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、無水リン酸二水素Na、香料を含有します。

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管して下さい。
- (2)お子さまの手のとどかない所に保管して下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。
- (4)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります）
- (5)他の人と共用しないで下さい。
- (6)使用期限の過ぎた製品は使用しないで下さい。

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **J-I-T** 薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号

電話 (072) 331-0417

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）