

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダストによる アレルギー性鼻炎の症状に

〈点鼻薬〉

第2類医薬品

# アネトン<sup>®</sup> コールタイジン

アネトンコールタイジンは、アレルギー性鼻炎などの鼻づまり、鼻みずなどの不快な鼻炎症状を改善する、定量噴霧式スプレータイプの鼻炎用点鼻薬です。



## 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

長期連用しないでください。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、ただちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

(2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合

## 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭が重い

## 【用法・用量】

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1～2度ずつ鼻腔内に噴霧	3時間以上の間隔をおいて、 6回まで使用できます。
7歳以上15歳未満	します。	
7歳未満	使用しないでください。	

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

## 〈定量噴霧式スプレーの使い方〉



## 〈使用にあたっての注意〉

噴霧するとき容器を下向きや横向きにしないで、必ず上向きでご使用ください。

容器の先端部を針などで突くと、折れたとき大変危険ですので絶対におやめください。



## 【成分・分量】


アネトンコールタイジン<sup>®</sup>は、無色澄明の液剤で、1mL中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	1mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます。
ベンゼトニウム塩化物	0.2mg	殺菌作用により、鼻粘膜の細菌の増殖をおさえます。
リドカイン	3mg	局所麻酔作用により、鼻粘膜の痛み、かゆみをしずめます。

添加物として、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、等張化剤を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限（外箱及び容器に記載）のすぎた製品は使用しないでください。



## 【包装】

アネトンコールタイジン：15mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

お客様相談室： ☎ 0120-834389

受付時間： 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2