ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

#### |第3類医薬品

口腔咽喉薬

# のどの痛み・はれ、口腔内の殺菌に

# カイゲントローチ

【特

私たちは、常に呼吸をしていますが、このときの空気の通り道を"気道"といいます。気道では、 せん毛と粘液によって、ほこりや細菌を浄化するとともに、適当な湿り気を与えています。ところが、 のどを使いすぎたり、空気の悪い所にずっといたりするとこの機能がおとろえ、のどに炎症がおこり ます。のどが乾いてきたなと思ったら炎症の始まりです。こんなときに、**カイゲントローチ**で早めに お手当てしてください。

カイゲントローチは、口の中でなめらかに溶けて、口腔内を殺菌・消毒し、のどの炎症による 声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのはれに優れた効果をあらわします。



# ∕!\使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 1.次の人は使用しないでください
  - (1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



#### 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を 中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を 受けてください。

症状の名称	症
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の かすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、 意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、 急激に悪化する。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って 医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能·効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・声がれ・のどのあれ・のどの不快感。 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去。

#### 【用法・用量】

1回1錠、1日6回を限度とし、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。使用間隔は2時間以上あけてください。

年 齢	1回量	1日使用回数
5歳以上	1錠	6回
5歳未満の幼児	使用しないでください。	

#### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量をよく守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみ込んだりしないでください。
- (4)トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してから使用してください。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



#### 【成分・分量】

6錠(1日量)中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	働き
セチルピリジニウム塩化物水和物	6 mg	殺菌作用をもち細菌の感染を予防します。
リゾチーム塩酸塩	36 mg (力価)	のどの粘膜に作用し、周辺の組織を強化し、 修復を促進します。それによって消炎・感染 予防の働きをします。
キキョウエキス	150 mg (原生薬換算量:600mg)	気道の粘液分泌を増加させます。

添加物として、還元麦芽糖水アメ、精製白糖、ゼラチン、マクロゴール、ポビドン、黄色5号、ステアリン酸Ca、*l-*メントール、アラビアゴム、香料を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の 多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に防湿に 注意し、変色した製品は、ご使用にならないでください。
- (5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。 カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911 受付時間:9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 カイゲンファーマ 株式会社

製造販売元 日新薬品工業株式会社

大阪市中央区道修町二丁目5番14号

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1