

第2類医薬品 口腔咽喉薬

J1



この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

さわやか冷涼感

消炎酵素剤リゾチーム塩酸塩配合

エスエスブロントローチ<クール>

SS BRON TROCHE COOL

さわやか冷涼感

味がよく、さわやかな冷涼感のあるトローチですから、お子さまや薬が苦手な方にも使用しやすく、のどや口の中をスッキリさせます。

のどのはれ・痛みに

消炎酵素剤・リゾチーム塩酸塩、炎症を抑えるグリチルリチン酸二カリウムやクロルフェニラミンマレイン酸塩が協力的に作用し、のどのはれや痛みをしのぎます。

殺菌・消毒に

セチルピリジニウム塩化物水和物は、のどや口の中の細菌に対して、すぐれた殺菌作用をあらわし、症状の悪化を防ぐとともに、口臭を除きます。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体质の人。

(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の症状のある人。 排尿困難

(5) 次の診断を受けた人。 緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

(裏面につづく) ® : 登録商標

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。
3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、使用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

■ 効能・効果

○のどの炎症によるのどのはれ・のどの痛み・声がれ・のどのあれ・のどの不快感

○口腔内の殺菌・消毒

○口臭の除去

★こんなときにエスエスプロントローチ(クール)をご使用ください。



かぜなどで、
のどが痛む



のどを
使いすぎた…



すいすぎによる、
のどの不快感

■ 用法・用量

次の量をかますに口中でゆっくり溶かしながら服用します。

年齢	成人(15才以上)	5才~14才	5才未満
1回量	1錠	1錠	
1日服用回数	4~6回	2~3回	服用しないこと

■ <用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)かみ碎いたり、飲み込んだりしないでください。
- (4)トローチの取り出し方

右図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してご使用ください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



■ 成 分 1錠中

リゾチーム塩酸塩	5mg(力価)
グリチルリチン酸二カリウム	2.5mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	1mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1mg
添加物として、キシリトール、無水ケイ酸、ゼラチン、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、ステアリン酸、タルク、香料を含有します。	

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>