

使用するときは、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

口腔咽喉薬

レーグル® トローチ

本剤は、口腔内を殺菌・消毒し、のどの痛みや炎症を鎮めるとともに、口臭の除去にも効果があるトローチ剤です。

アズレンスルホン酸ナトリウムは、うがい薬として咽喉炎・扁桃炎などに広く用いられている消炎剤です。グリチルリチン酸二カリウムには、抗炎症作用があります。クロルヘキシジン塩酸塩には、抗菌作用があり、口腔内の殺菌・消毒に効果があります。キキョウ流エキスには、抗炎症作用があり、のどの炎症を抑制します。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合



【効能・効果】

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

【用法・用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1錠	4～6回
15歳未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法、用量をお守りください。
- 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。

4. 使用の直前に1錠ずつ押し出して使用してください。
5. 本剤の取り出し方：図のように、本剤の入っているPTPシートの凸部を指先で押し、裏面のアルミ箔を破り取り出してください。（切り離れたPTPシートごと誤って飲み込みますと、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながりますのでご注意ください。）




【成分・分量】 1日量(6錠)中

成 分	分 量	作 用
クロルヘキシジン塩酸塩	30mg	抗菌作用があり、口腔内の殺菌・消毒
アズレンスルホン酸ナトリウム	4.8mg	咽喉炎・扁桃炎などに広く用いられている消炎剤
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	抗炎症作用があり、のどの炎症を抑制
キキョウ流エキス	400mg	抗炎症作用があり、のどの炎症を抑制

添加物として、白糖、トウモロコシデンプン、マクロゴール、ポビドン、l-メントール、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Mgを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、使用しない本剤の裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。又、切り離れたPTPシートの角で、手指などを傷つけないようご注意ください。
5. 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。
6. 外箱の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
7. 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く使用してください。
8. この説明文書には、本剤を使用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、使用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



お問い合わせ先

®：登録商標

摩耶堂製薬株式会社 くすりの相談室
 〒651-2142 神戸市西区二ツ屋1-2-15 TEL.078-929-0112(代表)
 受付時間：10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

販売元 **摩耶堂製薬株式会社**
 神戸市西区玉津町居住65-1

製造販売元 **京都薬品工業株式会社**
 京都市中京区西ノ京月輪町38番地