

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

口腔咽喉薬（トローチ剤）

のどのはれ、痛みに

第2類医薬品

# ラダー<sup>®</sup>A

## 製品の特徴

ラダーAは、のどの炎症を鎮めるリゾチーム塩酸塩やグリチルリチン酸二カリウム、炎症や口臭の原因になる細菌を抑える成分（クロルヘキシジン塩酸塩）を配合していますので、のどのはれや痛みを抑え、口臭を除去できる緑色のトローチ剤です。口の中に入れて、かまずにゆっくり溶かして使用いただくことで、効果を発揮します。



## 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

1. 次の人は使用しないこと。

本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- 2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師、歯科医師または薬剤師に相談すること。

1) 使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどが あらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティー ブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症(ライエル 症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激しい 症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

## 成分分量

1錠（成人1回量）中

成分	分量	はたらき
リゾチーム塩酸塩	7.5mg (力価)	消炎酵素剤で、のどのはれや痛みを緩和し、炎症によって生じた粘液を分解して不快な症状を取り除きます。
クロルヘキシジン塩酸塩	5mg	殺菌・消毒成分で、口やのどの粘膜で炎症や口臭の原因である細菌が感染・繁殖するのを抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	2.5mg	甘草由来の成分で、のどのはれや痛み、炎症を抑えます。

添加物としてトウモロコシデンプン、香料、白糖、アルギン酸Na、ポビドン、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNaを含有する。

## 用法用量

次の1回量を1日4～5回、口内で溶かして使用する。

年令	1回量
成人（15才以上）	1錠
15才未満	使用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

- 1) かみくだいたり、のみ込んだりしないこと。
- 2) トローチの取り出し方

トローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる）



## 効能効果

のどのはれ、のどの痛み、口腔内の殺菌、消毒、口臭の除去。

## 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

## 【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
（土・日・祝日を除く）



製造販売元  
**日水製薬株式会社**  
東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931