

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

口腔咽喉薬 コフジスACのどスプレー

第3類医薬品

コフジスACのどスプレーは、生薬（カミツレ）由来の抗炎症成分「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物」と、殺菌成分「セチルピリジニウム塩化物水和物（CPC）」を配合したのどスプレーです。

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物が、のどの炎症によるのどの痛みやはれを取り除き、セチルピリジニウム塩化物水和物がのどの患部を殺菌します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
□内のひどいだけ
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚（ふい）	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎。

【用法・用量】

1日数回適量を患部に噴射塗布して用いてください。

<用法・用量に関連する注意>


- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)のどや患部の塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- (4)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、噴射口をのどや口内の患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (5)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

<ご使用方法>

① キャップをはずしてください。



② ノズルを180°まわしてください。



③ 頭部を2~3回押して適量を患部に噴射してください。



④ 使用後はノズルを元の位置に戻しキャップをはめ、高温・直射日光をさげ、なるべく立てて保管してください。



【成分・分量】 100mL中

成分	分量	作用
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	20mg	消炎作用があり、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。
セチルピリジニウム塩化物水和物	300mg	うがい薬にも用いられる殺菌成分で、患部を殺菌します。

添加物として D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、グリセリン、プロピレングリコール、リン酸水素ナトリウム水和物、無水リン酸二水素ナトリウム、香料、安息香酸ベンジル、エタノール、ミツロウを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをはめて立てて保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造 福地製薬株式会社
販売元 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824