

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第3類医薬品

□腔咽喉薬

# のどの炎症による不快感に のどベアーるスプレーA

ロングノズルタイプ



のどのあれ、いたみ、はれ、不快感、声がれの症状は、かぜなどからの細菌感染によりのどに炎症を起こしたときに現れます。また、空気中のホコリ、花粉や排気ガス等の汚れた空気の吸い込み、タバコの吸い過ぎの他にカラオケでのどを使い過ぎたりしたときなどによっても起こります。

こんなときミントの香りののどベアーるスプレーAは、さわやかなミントの香りが口中に広がり、のどの炎症をおさえ、荒れたのどを正常なものの状態に戻してくれます。また、患部に有効成分のポピドンヨードがしっかり届くロングノズルタイプです。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 次の症状のある人。  
□内のひどいただれ
  - (3) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合も使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ




## 【用法・用量】

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いてください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) のどの塗布用にもみ使用し、内服しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、噴射口をのどの患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

### ＜容器の使用法＞

<p>＜使用方法＞</p> <p>(1) ①ノズルを起こし、ポンプ全体を指で支えます。 ②キャップを矢印方向に引き、取りはずしてください。</p> 	<p>(2) 頭部を2〜3回押して適量を患部に噴射してください。</p>  <p>最初は液が出るまで空押しを行ってください。</p>	<p>(3) 使用後はポンプ全体を指で支えてキャップをはめ、ノズルをもとの位置にもどして高温・直射日光をさけ保管してください。</p> 	<p>※携帯する時は液もれを防ぐためキャップをしっかりとりはめ、添付のビニール袋にいれ、しっかりと封をしてください。 ※キャップをしたまま噴射すると、キャップがとび、飲みこむおそれがありますので、必ずキャップを取ってから噴射してください。</p>
--	---	---	---

## 【成分・分量】

100mL中 ポビドンヨード……0.45g

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、l-メントール、アルコール、香料を含有します。

### ＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液がこぼれ衣類等に付着したら、すぐに水または洗剤で洗ってください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 携帯するときは、必ずキャップをして添付のグリーンの袋に入れてください。
- (7) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。
- (8) キャップをしたまま噴射すると、キャップがとび、飲みこむおそれがありますので、必ずキャップを取ってから噴射してください。
- (9) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

**福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **福地製薬株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824