

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

日本薬局方

咽喉塗布剤

複方ヨード・グリセリン

「東海」(AP)

有効期限：3年

Compound Iodine Glycerin



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
口内又はのどのひどいただれ
- (6) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害
- (7) 患部が広範囲の人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪 心
そ の 他	不 快 感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

のどの殺菌・消毒

【用法・用量】

適宜、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 塗布用にとのみ使用すること。
- (6) 薬液や綿等をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること。

【成分・分量】

100 mL 中 ヨウ素 1.2 g、液状フェノール 0.5 mL、グリセリン 90 mL 含有
添 加 物：ヨウ化カリウム、ハッカ水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店、あるいは下記に
お願いいたします。

東海製薬株式会社 お客様相談室
TEL：052-302-8501 (代表)
9：00～16：30 (土日・祝日を除く)