



# sato

## セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第3類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



### 歯科口腔用薬

内服用歯肉炎・歯槽膿漏薬

# アセス錠

塩化リゾチーム、ビタミンC配合

#### アセス錠は…

- 歯肉炎・歯ソノーローの諸症状に効果のある塩化リゾチーム配合の内服薬です。
- ビタミンCが歯肉からの出血を抑え、歯肉を丈夫に保ちます。
- 服用しやすいピンクの錠剤です。



#### 使用上の注意

##### ⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



##### ■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

★裏面につづく

## 〔効 能〕

歯槽膿漏・歯肉炎に伴う諸症状(歯ぐきの出血、発赤、はれ)の緩和

## 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を食後に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1錠	3回
15才未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

## 〔成分・分量と働き〕 3錠中

成 分	分 量	働 き
ビタミンC	450mg	血管を丈夫にして歯肉からの出血を抑えます。
塩化リゾチーム	90mg(力価)	歯肉の炎症や出血を抑える働きがあります。
コハク酸トコフェロール カルシウム	90mg	血行を促進して歯槽膿漏・歯肉炎に効果をあらわします。
銅クロロフィリン ナトリウム	90mg	歯肉の炎症の治りを早めます。

添加物として、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、黄色5号、赤色3号を含有します。

## 〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤に触れると、変色することがありますので、湿った手に出したり、触れたりしないでください。湿った錠剤は容器に戻さず廃棄してください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号