

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 歯の痛みに

5g

# デンター<sup>®</sup> 歯痛ゼリー

## DENTER<sup>®</sup> TOOTHACHE JELLY

デンター<sup>®</sup> 歯痛ゼリーはすぐれた3種の有効成分を配合した、歯痛のためのゼリータイプのおくすりで、がまんできない歯の痛みに、すばやい効果を発揮し良く効きます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください。

歯ぐき、唇



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】 歯痛

【用法・用量】 適量を綿棒、綿球に塗布し虫歯の穴に挿入するか、又は適量を虫歯の穴に直接塗り込んでください。

### \*用法・用量に関するご注意

- ①用法・用量をお守りください。
- ②痛みのある虫歯の穴以外の箇所には塗布しないでください。
- ③小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとにご使用ください。
- ④歯科用のみに使用し眼科用その他に使用しないでください。
- ⑤本品が歯以外のところに付いた場合には食味などを変化させる場合がありますので、ガーゼ等でふき取ってください。
- ⑥口のまわりや顔についた場合は、水でよく洗ってふき取ってください。
- ⑦虫歯は放置しておいては治りません。痛みがおさまったら、歯科医師による根本的治療をおすすめします。

## 【成分・分量】 1g中

オイゲノール50mg、dl-カンフル40mg、フェノール20mg

添加物：プロピレングリコール、グリセリン、エタノール、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、ジイソプロパノールアミン

## 【保管・取扱上のご注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

## — 消費者ご相談窓口 —

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら、下記発売元までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **J-IT** 薬品株式会社

大阪府松原市高見の里4-8-16

お客様相談室：072-331-0417

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

**ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168