

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

# 安中散

(アンチュウサン)

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意



### 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬により発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。  
発疹・発赤、かゆみ
  - (2) 1か月位服用しても症状の改善が見られない場合。

### 【効能・効果】

やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー。

### 【用法・用量】

下記の量を食前、食間または空腹時に水または白湯にて服用して下さい。  
(約1gをはかりうるサジを添付してあります。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1～2g	2～3回
15歳未満	服用しないこと	

### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。

### 【成分・分量】 (本品14g中)

日本薬局方 ケイヒ……………4.0g	日本薬局方 エンゴサク……………3.0g
日本薬局方 ボレイ……………3.0g	日本薬局方 ウイキョウ……………1.5g
日本薬局方 シュクシャ……………1.0g	日本薬局方 カンゾウ……………1.0g
日本薬局方外 リョウキョウ…0.5g	を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に服用のつど容器の口を十分にしめて保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本剤は生薬を原料とした製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5) 長い期間保存していて、再び服用される場合、薬が湿っていないか、不快な臭いがしないか、虫害がないか等をよく確かめ、万一そのようなことがあれば、服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先：株式会社ヤマダ薬研 電話 (06) 6722-0586 (代表)

受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



株式会社ヤマダ薬研

大阪府東大阪市菱屋西4丁目1番19号