

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

## 第2類医薬品 三九漢方胃腸薬

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【効能・効果】

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

#### 【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
2才以上4才未満	1/3 包	
2才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

#### <用法・用量に関する注意>

1. 2才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
2. 用法・用量を厳守すること。

#### 【成分・分量】

1日量3包（1包 1.5g）中

成 分	含有量	成 分	含有量
ケイヒ末	842.1 mg	エンゴサク末	631.6 mg
ボレイ末	631.6 mg	ウイキョウ末	315.8 mg
シュクシャ末	210.5 mg	カンゾウ末	210.5 mg
リョウキョウ末	105.3 mg	ブクリョウ末	1,052.6 mg

添加物：乳糖、無水ケイ酸を含有

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



## [三九漢方胃腸薬はこんなときに]



ストレスで胃がキリキリ痛む。  
ストレスで食欲がない。

神経性で胃のあたりが重苦しく、いつもスッキリしない。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話：076-472-1011

受付時間：9:00～16:30（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **北日本製薬株式会社**  
富山県中新川郡上市町若杉55