



JPS 漢方細粒－91号

漢方製剤

販売名 サンワ黄耆建中湯エキス細粒「分包」

本剤は、漢方処方「黄耆建中湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 令	1 回 量
成人(15才以上)	1 包
7才～14才	2 / 3 包
4才～6才	1 / 2 包
4才未満	服用しないこと

〔用法・用量に関連する注意〕

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………3包(1包2g)中

黄耆建中湯水製エキス……………2.3g

〔日局ケイヒ……………2.4g	日局シャクヤク…3.6g〕
〔日局ショウキョウ…0.6g	日局カンゾウ…1.2g〕
〔日局タイソウ……………2.4g	日局オウギ……………2.4g〕

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。
- 本剤は生薬(薬用の草根本皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記をお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電 話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社

横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1