

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かっこんとう

# 葛根湯エキス顆粒〔大峰〕

漢方製剤



## 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（裏面もお読みください）

## 効能

体力中等度以上のもので次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
7才～14才	2/3包	
4才～6才	1/2包	
2才～3才	1/3包	
2才未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分(3包6.0g中)

下記生薬より得た葛根湯エキス(3/4量)3.6gを含む。

カッコン	6.0g	シャクヤク	2.25g
マオウ	3.0g	カンゾウ	1.5g
タイソウ	3.0g	ショウキョウ	0.75g
ケイヒ	2.25g		

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖、二酸化ケイ素

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



販売元  
田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10



製造販売元  
大峰堂薬品工業株式会社  
奈良県大和高田市根成柿574

本品のお問い合わせは下記にお願いいたします。  
田辺三菱製薬「くすり相談センター」  
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)  
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30