

## 第2類医薬品

ここからあける

販売名：  
カッコリン葛根湯液



4



箱

ガラス：瓶  
金属：キャップ

使用期限

製造番号

### △ 使用上の注意

#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。
    - むくみ、排尿困難
  - 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 〈成分・分量〉

1日量 90mL (30mL×3本) 中

葛根湯エキス	4.31g
カッコン	8g
マオウ	4g
タイソウ	4g
ケイヒ	3g

シャクヤク 3g  
カンゾウ 2g  
ショウキョウ 1g

より得たエキス

添加物としてクエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラベン、プロピレングリコール、ブドウ糖果糖液糖、白糖、D-ソルビトール、香料を含有。

#### 〈効能・効果〉

体液中程度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

#### 〈用法・用量〉

成人（15才以上）1回1本1日3回、食間によく振ってから服用する。

- 用法・用量を厳守すること。
- 15才未満は服用しないこと。

#### 〈保管及び取扱い上の注意〉

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）

※生薬成分を配合しているため、沈殿が生じますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

#### 〈お問い合わせ先〉

お客様相談室 TEL:0744-54-2012  
AM8:30~PM5:00 土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度 TEL:0120-149-931

Mankin 万金薬品工業株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口317