

漢方製剤

第2類医薬品

かんぞうとう
甘草湯エキス〔細粒〕10

本方は、漢方の原典である「傷寒論」に記載されている処方、甘草のみで構成されている単味の処方です。急迫性の症状を目標とし、激しいせきや喉の粘膜が赤く腫れる咽喉痛、口内炎などに用いられます。



●使用上の注意●



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)次の症状のある人
むくみ
 - (5)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果●

激しいせき、咽喉痛、口内炎、しわがれ声

〔効能・効果に関連する注意〕

体力に関わらず、使用できます。

●用法・用量●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
大人(15才以上)	1 包	2.0g	3 回
15才未満7才以上	2/3包	1.3g	
7才未満4才以上	1/2包	1.0g	
4才未満2才以上	1/3包	0.7g	
2才未満	1/4包	0.5g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

●成分・分量●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

〔カンゾウ ……………5.3g〕

上記より製した甘草湯水製エキス2.7g(乾燥物換算で約1.35gに相当)を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦漢方株式会社 薬事学術部

TEL (052)883-5131 受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元

松浦漢方株式会社
名古屋市昭和区円上町24-21

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市緑区大高町寅新田36